

MOVIPREP® – Sauber gemacht!



Einnahme von **MOVIPREP®**

■ Halbes PEG-Trinkvolumen*

- Statt 4L nur 2L PEG-Trinkvolumen
- Hohe Patientenakzeptanz



■ Reinigungsleistung auf Goldstandard-Niveau



■ Hohe Reinigungsleistung¹ dank einzigartiger Wirkstoffkombination



Das beste Ergebnis erzielt die geteilte Einnahme der 2 Liter MOVIPREP®^{®2}



- 1 Liter am Vorabend + 1 Liter am Morgen + Mindestens zusätzlich 2 x 500 ml frei gewählte, klare Flüssigkeit
- der Untersuchung + der Untersuchung

■ Hohe Sicherheit für Ihre Diagnose

* wir empfehlen zusätzlich die Einnahme mindestens eines weiteren Liters frei gewählter, klarer Flüssigkeit
1 Ell C. et al., Endoscopy, 2006; 38 (suppl II) A18
2 Ell C. et al., Z Gastroenterol, 2005; 43 DOI: 10.1055

Darmreinigung in neuer Dimension

MOVIPREP®

Zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
Zur Anwendung bei Erwachsenen
Darmreinigungsmitittel



NORGINE
Norgine GmbH • Postfach 1840 • D-35007 Marburg • www.norgine.de • e-mail: info@norgine.de

Ihr Klick zu 45.000 Kongressen: www.norgine.de

* wir empfehlen zusätzlich die Einnahme mindestens eines weiteren Liters frei gewählter, klarer Flüssigkeit 1 Ell C. et al., Endoscopy, 2006; 38 (suppl II) A18
MOVIPREP® Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen Zusammensetzung: Beutel A enthält: Macrogol 3350 100g, Natriumsulfat 7,5g, Natriumchlorid 2,691 g, Kaliumchlorid 1,015g; Beutel B enthält: Ascorbinsäure 4,7g, Hilfsstoffe: Aspartam, Aceulfam-Kalium, Zitronenaroma.
Anwendungsbereiche: Zur Darmvorbereitung vor klinischen Maßnahmen, die einen sauberen Darm erfordern, z.B. endoskopische oder radiologische Untersuchungen des Darms. **Gegenanzeigen:** Gastrointestinale Obstruktion oder Perforation, Störungen der Magenentleerung, Ileus, Phenylketonurie, Glukose-6-Phosphatehydrogenase-Mangel, Toxisches Megakolon als Komplikation schwerer entzündlicher Darmerkrankungen, Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile. MOVIPREP® darf nicht bei bewusstlosen Patienten angewendet werden. **Nebenwirkungen:** Sehr häufig: Bauchschmerzen, Übelkeit, Blähungen, Analreizzungen, Abgeschlagenheit und Durst. Häufig: Hunger, Schlafräusungen, Schwindel, Erbrechen, Dyspepsie. Rigor. Gelegentlich: Hypophosphatämie, Kopfschmerzen, Dysphagie, Unwohlsein. Untersuchungen gelegentlich: Bikarbonatkonzentration im Blut vermindert, Calciumkonzentration im Blut vermindert, Hypercalcämie, Chloridkonzentration im Blut erhöht, Phosphatkonzentration im Blut vermindert, Leberfunktionstests normal. Möglichkeit allergischer Reaktionen (z.B. Hautausschläge, Urticaria, Ödeme, Anaphylaxie). **Handelsformen:** Eine Anwendung besteht aus 2 Btl. A und 2 Btl. B, Packungsgrößen mit 1 IN 1, 10, 40, 80, 160 und 320 Packungen einer einzelnen Anwendung. Klinikpackung mit 40 einzelnen Anwendungen. Apothekenpflichtig. Stand 03/2007



Stand 4/2008 Art-Nr. 7029
wir empfehlen zusätzlich die Einnahme mindestens eines weiteren Liters frei gewählter, klarer Flüssigkeit

Darmreinigung in neuer Dimension*
Niedriges PEG-Trinkvolumen
Hohe Reinigungsleistung
Hohe Reinigungsleistung¹

TRINKLÖSUNG ZUR
DARMREINIGUNG



+ASC

unterstützt

PEG-Wirkung



zuverlässige
Reinigung

*

PEG-
Trinkvolumen*

*

niedriges PEG-
Trinkvolumen*

*

MOVIPREP®
PEG + ASC (PEG 3350 + Natriumascorbat + Ascorbinsäure + Natriumsulfat + Elektrolyte)

wir empfehlen zusätzlich die Einnahme mindestens eines weiteren Liters frei gewählter, klarer Flüssigkeit